aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1765846
del 28/11/2024

Parco eolico Sella Chioggia, Bormida (SV)



Monitoraggio post-operam dei Chirotteri 2024

1 Premessa

Il progetto del parco eolico Sella Chioggia è nato nell'anno 2012 con la prima proposta di 2 turbine da 800 kW per un totale di 1,6MW, in adiacenza alle quattro macchine in esercizio del parco eolico Madonna della Neve, di analoghe caratteristiche dimensionali.

Il progetto 2012 ha visto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica il 28/04/2015 a cui ha fatto seguito l'iscrizione ai registri GSE per l'ottenimento della tariffa. Dopo alcuni anni in cui è stata scalata la graduatoria del registro GSE che a livello nazionale assegnava per tutt'Italia soltanto 60 MW l'anno, il sistema è stato cambiato, con impossibilità di accedere al registro per impianti > di 1 MW. Di conseguenza è stata persa la posizione utile in graduatoria e si è dovuto ripartire da zero.

Nel 2018 è stato deciso un upgrade del progetto con la scelta di installare una singola macchina di maggiore potenza (1 E92, 2,3 MW) al posto delle due macchine precedentemente autorizzate.
Tale variante è stata valutata positivamente dal Settore VIA in data 18/10/2018 (lista di controllo).
L'autorizzazione Unica presso la provincia di Savona è stata conseguita il 30 ottobre 2020 e di conseguenza solo l'anno successivo è stato possibile iscriversi all'asta GSE per il conseguimento della tariffa, ottenuta nel mese di maggio 2021.

La fondazione è stata realizzata nel mese di novembre 2022 e l'aerogeneratore è stato montato nell'estate successiva.

Le prime prove di produzione sono iniziate nel mese di novembre 2023.

La presente relazione illustra i risultati ottenuti dalla campagna di monitoraggio post operam realizzata con la medesima metodologia dei rilevamenti ante operam del 2022 nel periodo maggio-ottobre 2024.



Fig.1.1 – Realizzazione della fondazione dell'impianto eolico

2 Descrizione dell'area di studio

L'area oggetto di studio, denominata Sella Chioggia, si estende tra Madonna della Neve ed il Bric Chioggia alla quota di circa 960 m, perfettamente disposta in perpendicolare alla direttrice del vento dominante da NW. Dal punto di vista amministrativo l'area ricade sotto l'autorità dei comuni di Bormida e Rialto, mentre dal punto di vista geografico il sito è collocato a cavallo dello spartiacque ligure/padano che, in questo segmento, è rappresentato da una porzione delle Prealpi liguri.
La piazzola di progetto interessa un'area già disboscata per la conduzione di attività forestali di taglio legno e cippatura a margine del bosco di faggio, con mantello di noccioleto nelle aree più esposte al vento.



Fig.2.1 – Foto aerea dell’area di installazione


Fig.2.2 – Strada di accesso all’impianto



Fig.2.3 – Integrità del bosco adiacente alla piazzola di montaggio

La fase realizzativa dell'impianto ha prestato la massima attenzione a minimizzare in tagli delle piante ad alto fusto per mantenere la migliore integrità dei luoghi.



Fig.2.4 – Piantagione di nuovi alberi a margine della strada provinciale n. 23

3 Date di rilevamento 2024

Si riporta il calendario dei rilevamenti:

Data	Meteo
05 maggio 2024	Nuvoloso
27 maggio 2024	Nuvoloso
16 giugno 2024	Nuvoloso
18 giugno 2024	Sereno
17 luglio 2024	Poco nuvoloso
19 luglio 2024	Poco nuvoloso
28 agosto 2024	Sereno
31 agosto 2024	Sereno
19 settembre 2024	Nuvoloso
22 settembre 2024	Nuvoloso
15 ottobre 2024	Nuvoloso
22 ottobre 2024	Poco nuvoloso

4 Materiali e metodi

La definizione delle specie di chirotteri in foraggiamento nell'area dell'impianto eolico e la quantificazione della loro abbondanza, sono state ottenute con l'esecuzione di registrazioni con il bat-detector, la cui analisi ha poi permesso la determinazione delle specie.

E' stato utilizzato il batdetector MINIBAT della Wildlife Acoustics impostando registrazioni continuative da mezzora prima del tramonto a mezzora dopo l'alba senza la presenza dell'operatore.

Il punto di campionamento è stato scelto in un'area aperta adiacente a quella di progetto, fissando lo strumento ad un'altezza di circa 2 metri dal suolo.

Con questa configurazione lo strumento è in grado di rilevare agevolmente anche le specie che volano in quota rendendo del tutto obsoleto il campionamento con pallone, come più volte ribadito da i migliori esperti del settore e come si può dedurre da tutte le altre relazioni presentate).

Nel mese di giugno 2023 i rilevamenti sono stati condotti in contemporanea sul sito di progetto e in una stazione di controllo (Bikepark) distante circa 2 km

Rispetto ai rilevamenti ultracustici tradizionali con operatore, in genere condotti nelle ore notturne dal tramonto fino a non oltre le ore 01,00 del mattino, con il miniBAT coprendo l'intera notte e l'alba si riesce ad ottenere una fotografia maggiormente realistica delle specie che frequentano anche occasionalmente il sito di studio. Infatti Il periodo di campionamento è molto più lungo. Con una metodologia tradizionale di 4 punti di ascolto di 30 minuti in 12 giornate di osservazioni sarebbero state raccolte 24 ore di registrazione. Con il minibat nel 2022 sono invece state campionate circa 96 ore di registrazione dal tramonto all'alba, mettendo in evidenza per alcune specie anche periodi multipli di attività (subito dopo il tramonto e prima dell'alba) nello stesso giorno.





Fig. 4.1. - Il batdetector MINIBAT della Wildlife Acoustics.


5 Risultati 2024

L'analisi dei dati delle 12 giornate di monitoraggio ha portato ad individuare 988 contatti riferiti a 11 specie (*Pipistrellus pipistrellus*, *P. kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Barbastella barbastellus*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*).

Al fine di una corretta valutazione dei risultati raccolti occorre precisare che il numero di contatti non può essere considerato come una stima del numero di individui, ma deve essere considerato esclusivamente come un'indicazione sulla frequenza delle singole specie. Utilizzando come tecnica di raccolta dei dati quella dei punti di ascolto, esistono evidenti problemi legati ai doppi conteggi; la possibilità di contattare uno stesso individuo più volte è tutt'altro che remota, rendendo di fatto impossibile una corretta valutazione del numero di individui presenti nell'area (Agnelli et al. 2004).

Rispetto alla campagna di monitoraggio ante operam 2022 è stata censita una nuova specie, *Rhinolophus hipposideros*, sebbene individuata con un singolo contatto nel solo mese di agosto.


Nelle due giornate di rilevamento di agosto si è verificato un picco pronunciato del numero di contatti riferito alle specie *Pipistrellus pipistrellus*, *P. kuhlii* che ha portato ad una dominanza pronunciatissima nella composizione del popolamento annuale.





Su base annuale *Pipistrellus pipistrellus* insieme a *P. kuhlii* costituiscono il 94% del popolamento a dimostrazione della spiccata predilizione da parte di queste specie delle aree aperte di nuova costituzione.


Se dal computo si eliminano le due giornate di agosto la composizione del popolamento risulta praticamente identica a quella rilevata nella campagna ante operam del 2022 dove il Pipistrello

nano (Pipistrellus pipistrellus) 51%, il Pipistrello albolimbato (Pipistrello kuhlii) 18% ed il serotino comune (Eptesicus serotinus) 12%, rappresentavano in totale oltre l'80% del popolamento.




Composizione del popolamento 2022
2%
0%
18%
12%
0%
1%
0%
9%
6%
51%
HYP SAV
PIP PIP
PIP KUH
NYCLEI
BAR BAR
EPT SER
RHIFER
TAD TEN
MYO DAU
RHIHYP
NYC NOC


Composizione del popolamento 2024 senza agosto
23%
2%
0%
4%
1%
1%
0%
2%
12%
55%
HYP SAV
PIP PIP
PIP KUH
NYCLEI
BAR BAR
EPT SER
RHIFER
TAD TEN
MYO DAU
RHIHYP
NYC NOC



Tutte le altre specie sono state rinvenute in numeri estremamente modesti ed in modo discontinuo.

Sono saltuariamente presenti le due nottole *Nyctalus leisleri* e *Nyctalus noctula* ed il molosso *Tadarida teniotis.*

Per quanto riguarda le specie di maggiore interesse conservazionistico sono stati rilevati 1 contatto del Barbastello (*Barbastella barbastellus),* 3 del Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum)* e 1 del Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros).*

E' manifesta una cospicua similitudine con quanto rilevato nella canpagna ante operara del 2022.

6 Rilevamento delle eventuali presenze di carcasse

Nel periodo dei rilevamenti condotti da maggio ad ottobre in occasione del posizionamento del bat detector registratore e del suo ritiro sono state esaminate le superfici inghiaiate dell'impianto (strada di accesso e piazzale). In nessuna delle 24 trasferte condotte sono state rilevate carcasse.

7 Considerazioni sull'idea di regolazione preventiva della turbina a salvaguardia dei chirotteri

Non si comprende come uno screening del 2012 abbia individuato la necessità di una regolazione precauzionale per la macchina singola di Sella Chioggia in favore dei pipistrelli quando poi tutti i

provvedimenti autorizzativi degli anni successivi per parchi di maggiori dimensioni oggi in esercizio non lo hanno fatto.

Si tratta di un evidente disparità di trattamento che è anche priva di riscontri dai dati dei rilevamenti faunistici, particolarmente poveri rispetto ad altre aree della provincia di Savona.

Ad oggi in Italia sono stati installati oltre 12.000 MW di impianti eolici ed al momento non siamo a conoscenza che ci siano siti dove siano state prescritte delle regolazioni della turbina eolica per salvaguardare i chirotteri.

Questo tipo di provvedimento è stato adottato in Germania in pochi siti di particolare pregio all'interno di aree protette come i parchi nazionali.

Il dispositivo provoca tempi di fermo macchina che di conseguenza determinano una perdita di produzione annua stimabile in circa il 3-5%. La sua installazione deve essere quindi motivata da significative problematiche di conservazione dei chirotteri evidenziate dai monitoraggi preventivi o da significativi fenomeni di mortalità registrati presso il sito.

Roscioni e Spada (2014) nelle "Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici" hanno definito per impianti di 1-9 generatori un rischio di impatto basso. A maggior ragione questo concetto dovrebbe essere applicato ad una installazione singola.

Gli stessi autori per quanto riguarda gli impatti specie specifici classificano le seguenti specie a rischio alto: *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817) dal momento che volano ad altezze elevate dal suolo.

I monitoraggi pre e post intervento a Sella Chioggia hanno evidenziato un numero minimo di queste specie che volano ad alta quota.

Le specie di maggiore interesse conservazionistico come il Barbastello (*Barbastella barbastellus), o* il Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum)* sono state rilevate con numeri esigui e non volano alle quote dove girano le pale, ad oltre 30 metri dal suolo.

Si ricorda infine che i numerosi studi post intervento realizzati presso siti eolici della provincia di Savona (Rialto, Mallare Feglino, Cairo Montenotte) hanno evidenziato un incremento dell'abbondanza e della diversità specifica dei chirotteri negli anni successivi alla realizzazione dei parchi eolici e l'assenza di evidenze di collisioni, nonostante specifiche campagne di ricerca delle carcasse.

Di conseguenza non esistono i presupposti scientifici per richiedere un'eventuale regolazione della macchina per mitigarne presunti impatti che i monitoraggi post intervento ad oggi hanno smentito.

Bisognerebbe porre maggiore attenzione sulle pesanti attività di disboscamento condotte presso il crinale.




Fig. 7.1 – Aree disboscate presso l'impianto eolico Sella Chioggia.



Fig. 7.2 – Altre aree disboscate nel 2024 presso la strada provinciale n. 23

8 Conclusioni

La reale distribuzione dei chirotteri è per fortuna sottostimata se si vanno ad analizzare soltanto i crinali dove vengono installati gli impianti eolici, dove anche in questo caso la composizione del popolamento risulta stabile negli anni.

Per apportare nuovi dati per i database regionali della biodiversità sarebbe auspicabile studiare nuovi siti verso il fondovalle, piuttosto che continuare a monitorare lo stesso crinale per decenni.

Complessivamente il sito di Sella Chioggia è classificabile come di modesto interesse per la chirotterofauna.

Il potenziale impatto di un intervento puntiforme come quello di una singola turbina eolica è totalmente irrilevante rispetto all'incidenza in termini di alterazione degli habitat e dei relativi equilibri rappresentato dal taglio intensivo e, almeno in alcuni casi, indiscriminato di ampie superfici boscate in corso sul crinale nella macroarea.

Genova, 11/11/2024

dott. Massimiliano Babbini

dott. Marco Relini



Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

NOME ITALIANO: PIPISTRELLO ALBOLIMBATO



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Taglia piccola. Colorazione molto variabile, marrone-ruggine-bruna, con ventre solo leggermente piu' chiaro del dorso. Muso e orecchie bruni. Trago corto, con apice arrotondato. Lunghezza testa-corpo 40-47 (50) mm; avambraccio 31-36 (37) mm; apertura alare 210-240 mm; peso 5-10 g.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Specie Turanico-Mediterranea, diffusa in Europa meridionale e in espansione verso Nord (limite Nord accertato in Russia a 57° di latitudine), presente in Africa orientale, Penisola Arabica e, a Est, fino all'India Nord-orientale e, forse, alla Cina. In Italia e' segnalata in tutte le regioni.

DATI DEMOGRAFICI

Sebbene non si disponga di dati precisi, la specie appare localmente molto frequente; in Italia rappresenta probabilmente il Chirottero piu' comune nelle aree di bassa altitudine e in particolare negli ambiti urbani.

Nelle nursery si contano prevalentemente meno di 30 femmine adulte, ma non sono infrequenti le colonie con più di 100 esemplari.

HABITAT

Predilige le aree di bassa o media altitudine, ove si riscontra in tipologie ambientali varie. I rifugi naturali sono rappresentati da cavità arboree e fessure delle rocce, in sostituzione ai quali la specie trova condizioni ottimali negli interstizi delle costruzioni antropiche (cassonetti, fessure dei muri,

spazi dietro i frontalini metallici, ecc.) e in collocazioni ipogee artificiali (fori di mina). E' una delle specie più antropofile della nostra chirotterofauna.

Probabilmente sedentaria.

ALIMENTAZIONE

P. kuhlii caccia prevalentemente entro 10 metri di altezza dal suolo, sotto i lampioni, presso le fronde degli alberi o sopra superfici d'acqua. Le prede vengono catturate in volo: piccoli Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri, Coleotteri, Emitteri.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Gli accoppiamenti hanno luogo nella tarda estate e in autunno. I parti cadono in giugno; prevalentemente vengono partoriti due piccoli, piu' raramente uno solo. Le colonie riproduttive sono generalmente composte da sole femmine; i maschi adulti conducono vita solitaria o in piccoli gruppi per gran parte dell'anno. La maturita' sessuale viene raggiunta nelle femmine gia' nel primo anno di vita.

L'età massima nota è di 8 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

La specie viene occasionalmente predata da Strigiformi. In Valle d'Aosta e' stata osservata in ibernazione nello stesso ambiente di *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*, *Eptesicus serotinus* e *Barbastella barbastellus*, all'interno di fori di mina presso l'ingresso di miniere abbandonate.

FATTORI D'INTERFERENZA

La specie è abbondante in molte aree ed in espansione del suo areale verso Nord. Data la sua notevole antropofilia, si ritiene meno sensibile di altri Chirotteri alle alterazioni ambientali.

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)



NOME ITALIANO: PIPISTRELLO NANO

TASSONOMIA

Fino ad epoca recente, sotto la denominazione *P. pipistrellus* venivano confuse due specie, pressoche' identiche nell'aspetto e nelle dimensioni. Analisi bioacustiche, prima, e genetiche poi, hanno consentito la discriminazione di *P. pipistrellus* dalla specie sorella, denominata *P. pygmaeus*. La maggior parte delle informazioni di letteratura sono antecedenti alla revisione sistematica e vanno pertanto riferite al complesso delle due specie.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Taglia piccola. Colorazione dorsale variabile dal castano-rossiccio al bruno scuro; ventre più chiaro, marrone- giallognolo o marrone-grigio. Muso e orecchie bruni. Trago corto, con apice arrotondato. Lunghezza testa-corpo (32) 36-52 mm; avambraccio 27-32 (35) mm; apertura alare 180-250 mm; peso 3,5-8,5 g.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

La specie è considerata un'entita' euro-centroasiatica, con areale comprendente quasi tutta l'Europa (fino al limite latitudinale di 63-64° N), il Nord-Africa e parte dell'Asia Sudoccidentale; in Italia, in particolare, segnalazioni di presenza sono riportate per quasi tutte le regioni. Un quadro distribuzionale dettagliato risulta tuttavia attualmente mancante per la necessità di rimettere in discussione i dati antecedenti la discriminazione della specie sorella *Pipistrellus pygmaeus*.

DATI DEMOGRAFICI

La specie è stata lungamente considerata il Chirottero europeo più abbondante e, per tale ragione, denominata anche "Pipistrello comune". Sul complessivo territorio italiano è tuttavia sicuramente superata in abbondanza dal Pipistrello albolimbato, rispetto al quale (sulla base dei limitati dati disponibili) sembrerebbe divenire più frequente e abbondante salendo in altitudine. Le informazioni disponibili, sia a livello nazionale che europeo, sono prevalentemente antecedenti alla descrizione di *P. pygmaeus* e, come tali, necessitano di revisione. Le colonie riproduttive possono annoverare da qualche decina, fino a diverse centinaia di esemplari.

HABITAT

Specie adattabile e antropofila, frequenta per il foraggiamento una gran varietà di tipologie ambientali, dalle zone umide, ai boschi, a zone con vegetazione più rada, ai nuclei urbani (caccia attorno ai lampioni). I siti di rifugio, sia in inverno che in estate, sono di tipo interstiziale: negli edifici (fessure delle pareti, cassonetti persiane, spazi retrostanti grondaie o elementi di copertura dei tetti, ecc.), sotto i ponti, all'interno di cavita' ipogee, su pareti rocciose esterne, negli alberi. E' considerata specie prevalentemente sedentaria.

ALIMENTAZIONE

Preda in volo insetti di piccole dimensioni, principalmente Ditteri (soprattutto Chironomidi, Ceratopogonidi e Tipulidi), ma anche Tricotteri, Efemerotteri, Emitteri, Lepidotteri, Imenotteri e Neurotteri.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Accoppiamenti da fine agosto a fine settembre. Durante tale periodo, i maschi denotano comportamento territoriale e richiamano le femmine all'interno dei siti di accoppiamento, dove si formano piccoli harem (fino a una decina di femmine). In primavera le femmine possono cambiare più volte sito di rifugio. I parti hanno luogo in giugno- luglio e prevalentemente sono gemellari. Massima longevità accertata: 16 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

Sono segnalate aggregazioni miste con molte altre specie di Chirotteri, in parte da verificare alla luce del riconoscimento del rango specifico a *P. pygmaeus*.

FATTORI D'INTERFERENZA

Locali decrementi di colonie sono stati posti in relazione a trattamenti delle parti in legno degli edifici con sostanze tossiche e avvelenamenti da pesticidi ad uso agricolo.

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)



NOME ITALIANO: SEROTINO COMUNE

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Grossa taglia. Colorazione marrone, leggermente più chiara sul ventre, marrone giallognolo. Muso e orecchie bruno scuro. Trago con apice arrotondato. Lunghezza testa-corpo 62-80 (82) mm; avambraccio 48-56 (58) mm; apertura alare 315-380 mm; peso 15-33 (35) g.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Specie paleartica, presente nell'Europa centro-meridionale (limite Nord intorno ai 56° di latitudine), in Nord-Africa, Medio Oriente, Asia centrale e, ad Est, fino alla Cina settentrionale. In Italia è segnalata in quasi tutte le regioni e l'assenza di dati per alcune è probabilmente dovuta a carenza di rilevamento.

DATI DEMOGRAFICI

Dati isolati depongono a favore di locali espansioni della specie, mentre altrove sono segnalati decrementi demografici e perdita di colonie. I pochi dati disponibili per l'Italia sono insufficienti a valutare le tendenze demografiche in atto. Le nursery annoverano 10-50 (100) femmine.

HABITAT

Predilige le altitudini inferiori, ma risulta segnalata fino a 1800 m. Utilizza come aree di foraggiamento preferenziali margini forestali e agroecosistemi con siepi e pascoli, ma può anche cacciare in parchi e giardini urbani e nelle aree edificate (segnalata presso i lampioni, in altri contesti pare tuttavia evitarli). Siti di rifugio estivi all'interno di edifici e alberi. Siti invernali in cavita' sotterranee naturali o artificiali o in edifici. Specie considerata sedentaria, ma che effettua almeno occasionalmente significativi voli di dispersione; il maggior spostamento documentato è di 330 km.

ALIMENTAZIONE

Dieta basata prevalentemente su Coleotteri (fra i quali varie specie coprofaghe) e, in misura minore, Lepidotteri, Ditteri, Emitteri e Imenotteri. Tra le prede compaiono rappresentanti di diversi gruppi

diurni, che vengono catturati durante il riposo sulle foglie o al suolo; le restanti prede sono catturate in volo.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Accoppiamenti tardo-estivi autunnali (dalla fine di agosto). Le colonie riproduttive si aggregano in aprile-maggio e i parti (normalmente un unico piccolo) hanno luogo in giugno; il rifugio riproduttivo viene cambiato frequentemente.

Massima longevita' accertata: 23 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

Osservata in aggregazioni miste con varie altre specie, fra cui *Pipistrellus kuhlii*, *P. nathusii* e *Nyctalus noctula*.

FATTORI D'INTERFERENZA

Alterazione dei siti di rifugio, in particolare, in centro-Europa sono descritti effetti negativi dovuti ai trattamenti delle parti in legno degli edifici con prodotti tossici. Perdita di entomofauna coprofila a causa dei trattamenti antielmintici (avermectine) effettuati sul bestiame.

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)



NOME ITALIANO: PIPISTRELLO DI SAVI

TASSONOMIA

La specie è stata a lungo considerata come appartenente al genere *Pipistrellus,* ma recenti studi hanno dimostrato che essa è ben differenziata da tale gruppo sistematico.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Piccola taglia. Sul mantello del dorso, generalmente bruno scuro, spiccano le punte dei peli di colore giallastro; l'addome si presenta grigio chiaro, con sfumature giallastre; muso, orecchie e membrane alari sono brune. La coda sporge dal margine della membrana caudale di 3-5 mm. Il trago denota misure equivalenti di altezza e larghezza.

Lunghezza testa-corpo (40) 43-52 mm; avambraccio 30-37 (38) mm; apertura alare 220-250 mm; peso 5-10 g.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Specie Centroasiatico-Mediterranea, diffusa nell'Europa meridionale (limite Nord intorno ai 47° di latitudine), in Nord Africa, in Asia centrale e a Est, fino all'India nord-orientale e al Giappone settentrionale. In Italia risulta rilevata in quasi tutte le regioni e le assenze di segnalazioni sono probabilmente da imputare a carenza di rilevamento.

DATI DEMOGRAFICI

In Italia la specie è considerata diffusa e abbondante, tuttavia non si dispone di dati demografici precisi. Le colonie riproduttive sono composte da 5-70 femmine. In altri Paesi è meno frequente, ma considerata demograficamente stabile. In Germania risulta estinta.

HABITAT

E’ segnalata presso tipologie ambientali varie, dal livello del mare a oltre 2000 metri di quota (è una delle specie che sale più in alto). A comportamento rupicolo, frequenta gli interstizi delle pareti rocciose e, più raramente, delle cavità ipogee; risulta segnalata anche nei cavi degli alberi e sotto le cortecce sollevate. Negli edifici ritrova condizioni analoghe negli interstizi: fessure dei muri, spazi dietro le imposte, piccoli volumi fra le tegole e il rivestimento dei tetti e fra i muri e gli oggetti appesi. Potrebbe trattarsi di una specie sedentaria o migratrice occasionale, ma mancano dati per una caratterizzazione, anche preliminare, dei suoi spostamenti. Per essa è segnalato uno spostamento massimo di 250 km, che tuttavia non risulta adeguatamente documentato.

ALIMENTAZIONE

Può cacciare sia a bassa altezza (sull’acqua, presso le chiome degli alberi, attorno ai lampioni), sia a parecchie decine di metri dal suolo. Vengono predati insetti di piccola taglia, in particolare Ditteri, Lepidotteri, Imenotteri, Neurotteri ed Emitteri.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Gli accoppiamenti hanno luogo in agosto-settembre. I parti si collocano in giugno-luglio e sono di solito gemellari (piu' raramente viene partorito un unico piccolo). Le femmine diventano mature sessualmente a un anno di vita.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

La specie viene occasionalmente predata da Strigiformi.

FATTORI D'INTERFERENZA

In relazione alla frequentazione di spazi interstiziali negli edifici, la specie è sottoposta ai fattori d'interferenza che possono agire su tali rifugi (occlusione accessi, trattamento delle strutture con prodotti tossici ecc.).

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)



NOME ITALIANO: NOTTOLA DI LEISLER

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Taglia media. Colorazione dorsale bruno-rossiccia; colorazione ventrale giallastra. Muso e orecchie brunastre. Trago a forma di champignon. Ali lunghe e strette. Lunghezza testa-corpo 48-75 mm; avambraccio (37) 40-47 mm; apertura alare 260-320 mm; peso 11-20 g.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Specie Turanico-Europea, diffusa nei Paesi europei fino al limite di circa 56° di latitudine Nord, in Africa nordoccidentale e, in Asia, segnalata irregolarmente fino all'India nordoccidentale. In Italia è segnalata nelle regioni settentrionali e centrali, nonché in Campania e Sardegna.

DATI DEMOGRAFICI

Specie di difficile rilevamento in relazione alle abitudini primariamente arboricole. Le nursery sono prevalentemente composte da 20-50 femmine, ma in Irlanda, sono numerose le colonie con centinaia di individui. In ibernazione sono stati osservati sia esemplari isolati sia colonie.

HABITAT

Specie considerata forestale soprattutto per la scelta dei siti di rifugio (estivi e invernali), rappresentati elettivamente da cavita' arboree. In vicarianza di questi, è stata osservata in bat box o all'interno di edifici (cassonetti delle persiane, fessure e altri interstizi). Durante la buona stagione cambia frequentemente sito di rifugio, denotando tuttavia fedeltà, anche pluriennale, agli alberi-roost, che vengono periodicamente riutilizzati. Si foraggiamento denota comportamento piuttosto opportunista, cacciando negli spazi aerei liberi sopra o sotto la volta forestale, nelle radure, sopra zone umide e presso i lampioni. In Italia risulta segnalata dal livello del mare fino a 2350 metri.

Specie migratrice (NE-SW), per essa e' stato registrato uno spostamento record di 1567 km.

ALIMENTAZIONE

Cattura le sue prede in volo, in prevalenza piccoli Ditteri, Lepidotteri,Tricotteri e Coleotteri.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Stagione degli accoppiamenti tra agosto e settembre-ottobre. I maschi occupano un rifugio in cui si costituisce un harem, che può contare fino a una decina di femmine. Le femmine partoriscono uno o due piccoli, intorno al mese di giugno. L'età massima registrata per la specie e' di 12 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

Sono note colonie miste con *N. noctula*, *N. lasiopterus*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii*.

Barbastella barbastellus Schreber, 1774



NOME ITALIANO: BARBASTELLO

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Il pelo, folto ed ispido, è di colore bruno-nerastro e tende ad incanutirsi con l'età: la testa è piccola, con muso prognato ed orecchie di consistenza piuttosto spessa, con pieghe addizionali che vanno a riunirsi in mezzo agli occhi piccolissimi. Le aree glabre della faccia sono nerastre, mentre il patagio è grigiastro e gli arti sono di colore carnicino. La lunghezza testa-tronco è di 44-60 mm con un'apertura alare di 240-290 mm.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Con due sottospecie (B. barbastellus barbastellus e B. barbastellus guanchae) la specie è diffusa dall'Europa occidentale (Inghilterra compresa) fino al Caucaso, alla Bulgaria, alla Turchia ed alla penisola di Crimea; la si trova anche in Marocco, alle Canarie e, forse, in Senegal. In Italia la specie è presente su tutto il territorio peninsulare, oltre che in Sicilia, Sardegna e Corsica, mentre non è segnalata la sua presenza a Malta. Predilige le aree boscose collinari e montane, fino ad altezze di 2000 m: lo si può trovare anche in aree antropizzate, mentre è piuttosto raro osservare questi animali in aree pianeggianti

DATI DEMOGRAFICI

Minacciata d'estinzione. Il Barbastello è considerata una delle specie più rare fra i chirotteri europei. Probabilmente la sua frequenza è stata sottostimata per la sua ecologia prettamente forestale.

HABITAT

Si tratta di animali crepuscolari, che passano il giorno prevalentemente nelle abitazioni (fenditure nei muri, sotto le tegole, dietro imposte di finestre, nei solai etc.), ma possono rifugiarsi anche in cavità di alberi e, nelle parti meridionali del proprio areale, nelle grotte.

Durante l'inverno (da ottobre ad aprile), la specie è solita andare in letargo in ambienti sotterranei (grotte, gallerie), dove gli animali si riuniscono in colonie che contano fino a un migliaio di individui: gli ibernacoli sono spesso ventilati e piuttosto secchi per i canoni di umidità richiesti dai pipistrelli in ibernazione (umidità pari al 70% od anche inferiore), ed al loro interno spesso gli animali si dispongono nelle zone prossime all'uscita, dove l'animale in letargo può anche trovarsi circondato da ghiaccioli o ricoperto di nevischio. Il barbastello è assai resistente alle basse temperature: qualora l'animale venga disturbato durante il letargo, esso non esita ad involarsi e cercare altri ibernacoli, anche in pieno inverno. Il rifugio diurno viene abbandonato al tramonto, a volte anche durante il giorno: l'animale si invola anche in caso di cattive condizioni meteorologiche. Il barbastello vola ad un'altezza media di cinque metri, con volo lento e grande capacità di manovra anche in spazi ristretti, grazie alla forma falciforme delle ali.

ALIMENTAZIONE

La specie caccia prevalentemente nei pressi di specchi d'acqua o fra le chiome degli alberi: nel primo caso si nutre principalmente di insetti che cattura in volo, mentre nel secondo caso può ghermire vari tipi di artropodi, per poi consumarli con calma, magari pendendo da un ramo. La conformazione della bocca, piccola e con una mandibola assai delicata, impedisce all'animale di nutrirsi di specie troppo coriacee o di grosse dimensioni. La caccia avviene lungo percorsi predefiniti, che hanno generalmente forma circolare od ellissoidale ed un diametro di un centinaio di metri.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO

Gli esemplari si accoppiano tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno: la gravidanza dura circa sei mesi, al termine dei quali le femmine danno alla luce un unico cucciolo in apposite zone adibite a nursery delle quali prendono possesso a partire dal mese di giugno e nelle quali vivono in colonie di una trentina di individui, ma a volte anche oltre il centinaio, rigorosamente tutti di sesso femminile. I cuccioli hanno crescita assai rapida e dopo circa un mese sono in grado di volare, per raggiungere la taglia definitiva attorno ai due mesi di vita. La speranza di vita di questi animali sfiora i 22 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

La specie viene occasionalmente predata da Strigiformi.

FATTORI D’INTERFERENZA

La perdita di habitat e la diminuzione delle prede sono i maggiori pericoli per la specie.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)



NOME ITALIANO: FERRO DI CAVALLO MAGGIORE

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Pipistrello di piccole dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 38 e 48 mm, la lunghezza dell'avambraccio tra 35,9 e 42,5 mm, la lunghezza della coda tra 22 e 33 mm, la lunghezza del piede tra 6,9 e 9 mm, la lunghezza delle orecchie tra 12 e 19 mm, un'apertura alare fino a 25,4 cm e un peso fino a 9 g. La pelliccia è lunga, soffice e lanuginosa. Le parti dorsali variano dal bruno-grigiastro al marrone, mentre le parti ventrali sono più chiare, grigiastre o bianco-grigiastre. Le orecchie sono di dimensioni normali. La foglia nasale presenta una lancetta triangolare, con i bordi leggermente concavi e l'estremità appuntita, un processo connettivo basso, leggermente arrotondato e talvolta appiattito, una sella priva di peli, lunga, stretta, cuneiforme, con l'estremità appuntita curvata in avanti e verso il basso. La porzione anteriore è stretta ma copre interamente il muso ed è provvista di un profondo incavo centrale alla base. Il labbro inferiore ha un solo solco longitudinale. Le membrane alari sono marroni o marroni scure. La coda è lunga ed inclusa completamente nell'ampio uropatagio. Il primo premolare superiore è relativamente grande e situato lungo la linea alveolare

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Questa specie è diffusa nell'Ecozona paleartica, dall'Europa occidentale, Africa nord-occidentale, Vicino oriente attraverso il Caucaso e l'Iran fino al Kashmir. In Italia è presente su tutto il territorio, isole comprese.

Vive nei boschi e nelle vicinanze di insediamenti umani fino a 2.000 metri di altitudine.

DATI DEMOGRAFICI

La popolazione è in regresso per la perdita di ambienti di alimentazione dovuta ad intensificazione dell'agricoltura e all'uso di pesticidi oltre che per la riduzione di siti di rifugio utili (ipogei e negli edifici).

HABITAT

In estate si rifugia in colonie numerose all'interno degli edifici nelle zone più settentrionali dell'areale, grotte e gallerie minerarie in quelle più meridionali. In questo periodo forma vivai costituiti da diverse centinaia di femmine ed alcuni maschi. In inverno entra in ibernazione solitariamente all'interno di grotte, gallerie minerarie e cantine, con temperature di 4-12 °C ed elevata umidità relativa. Rimane aggrappato alle pareti o alle volte con i soli piedi. L'attività predatoria inizia al tramonto. Il volo è agile, altamente manovrato ed effettuato fino a 5 metri dal suolo. È una specie sedentaria, con spostamenti massimi fino a 153 km.

ALIMENTAZIONE

Si nutre di insetti, particolarmente ditteri, lepidotteri, neurotteri e tricotteri catturati sul terreno o sui rami nei boschi, parchi, boscaglie e cespugli.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIV0

Danno alla luce un piccolo alla volta nella seconda metà di giugno. Il nascituro apre gli occhi dopo 10 giorni di vita, è in grado di volare dopo un mese ed è completamente indipendente dopo altre 2 settimane. Gli accoppiamenti avvengono in autunno e più raramente in inverno. Entrambi i sessi diventano maturi dopo 1-2 anni di vita. L'aspettativa di vita massima è di 21 anni.

RAPPORTI CON ALTRE SPECIE

La specie viene occasionalmente predata da Strigiformi.

FATTORI D'INTERFERENZA

Perdita di ambienti di alimentazione per intensificazione dell'agricoltura e uso di pesticidi. Sfruttamento turistico delle grotte.

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)



NOME ITALIANO: FERRO DI CAVALLO MAGGIORE

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

La pelliccia è corta, fine, soffice e densa. Le parti dorsali sono grigio cenere o grigio-brunastre con la base dei peli biancastra, mentre le parti ventrali sono più chiare. Il muso è lungo, troncato, con il labbro superiore che si estende ben oltre quello inferiore e ricoperto da 4 pliche cutanee e da piccole setole spatolate. Le orecchie sono grandi, nerastre, triangolari ed unite anteriormente alla base. Il trago è corto e nascosto dietro l'antitrago, il quale è grande e rettangolare. Le membrane alari sono nerastre e attaccate posteriormente sopra le caviglie. I piedi sono piccoli con un cuscinetto sulla pianta. La coda è lunga, tozza e si estende per più della metà oltre l'uropatagio.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Questa specie è diffusa dall'Europa meridionale ed Africa settentrionale attraverso il Vicino oriente e la Penisola arabica fino all'Asia centrale e la Birmania settentrionale.

DATI DEMOGRAFICI

Specie diffusa su tutto il territorio seppure a bassa densità.

HABITAT

Vive in ambienti semi-aridi e zone più umide, fenditure rocciose, ambienti urbani, strutture artificiali come edifici Si rifugia nelle fessure rocciose dove forma gruppi tra 5 e 400 individui. In estate forma vivai fino a 160 femmine. Entra in ibernazione nei periodi più freddi, tuttavia non raggiunge uno stato di profonda letargia ma piuttosto un torpore che lo induce al risveglio quando il clima tende temporaneamente a migliorare. Il volo è veloce, rettilineo ed effettuato a circa 10-20 metri di quota. L'attività predatoria inizia con il buio o al crepuscolo e di solito prosegue anche con il cattivo tempo.

ALIMENTAZIONE

Si nutre di insetti, particolarmente falene, coleotteri, ditteri e neurotteri, catturati a circa 10-50 metri dal suolo.

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIV0

Le femmine raggiungono la maturità sessuale nel primo anno e danno alla luce un solo piccolo all'anno, tra giugno e luglio. L'aspettativa di vita supera i 10 anni.

FATTORI D'INTERFERENZA

Non soggetta a minacce importanti, e capace di utilizzare anche ambienti antropizzati e pertanto viene valutata a Minor preoccupazione (LC).