
Università degli Studi di Genova
- DISTAV -

Lab. di Sedim. e Geologia Marina


ANALISI GRANULOMETRICA

Campione: **Campione-4A-Sturla-16012024.xlsx**

SHEPARD
(modified by Schlee - 1973)




FOLK (1970)



G	Ghiaia
sG	Ghiaia sabbiosa
mG	Ghiaia pelitica
gS	Sabbia ghiaiosa
gM	Pelite ghiaiosa
S	Sabbia
mS	Sabbia pelitica
sM	Pelite sabbiosa
M	Pelite

Tot analizz. (gr.):	626,30
Tratt. 230M (%) :	99,66
Pass. 230M (%) :	0,34
GHIAIA (> 2mm) :	70,04%
SABBIA (> 63µm) :	29,63%
LIMO (> 2µm) :	0,34%
ARGILLA (< 2µm) :	0,00%

SETACCIATURA:



Trattenuto (gr.)	Tratt. cum. %
0,00	0,00
0,00	0,00
92,97	14,84
88,45	28,97
80,77	41,86
56,52	50,89
37,48	56,87
41,37	63,48
41,08	70,04
13,93	72,26
7,51	73,46
12,99	75,53
15,80	78,06
32,21	83,20
51,92	91,49
37,40	97,46
12,40	99,44
1,10	99,62
0,30	99,66

Diam. (mm.)	Trattenut diff. %
128,000	0,00
64,000	0,00
32,000	0,00
16,000	14,84
11,200	14,12
8,000	12,90
5,600	9,02
4,000	5,98
2,800	6,61
2,000	6,56
1,400	2,22
1,000	1,20
0,710	2,07
0,500	2,52
0,355	5,14
0,250	8,29
0,177	5,97
0,125	1,98
0,088	0,18
0,063	0,05

Commenti / Note / Doc. fotografica

///

///


ANAL. SEDIGRAFO:

Tratt. cum %	Diam. (mm.)	Trattenut diff. %
100,00	0,04400	0,34
100,00	0,03150	0,00
100,00	0,02240	0,00
100,00	0,01600	0,00
100,00	0,01120	0,00
100,00	0,00800	0,00
100,00	0,00560	0,00
100,00	0,00400	0,00
100,00	0,00280	0,00
100,00	0,00200	0,00
100,00	0,00140	0,00
100,00	0,00100	0,00
100,00	0,00071	0,00
100,00	0,00050	0,00

Pagina 1: dati acquisiti


CURVA GRANULOMETRICA

Standard AGI/S :



PARAMETRI STATISTICI

Trattenuto %	Dimens. in mm.	Dimens. in Phi
1° percentile	30,9221	-4,9506
5	26,6107	-4,7339
10	21,2215	-4,4075
15	15,9471	-3,9952
16	15,6072	-3,9641
25	12,5483	-3,6494
35	9,7030	-3,2784
45	7,1658	-2,8411
50	5,8361	-2,5450
55	4,5005	-2,1701
65	2,6143	-1,3864
75	0,7847	0,3498
84	0,3449	1,5359
85	0,3322	1,5899
90	0,2689	1,8950
95	0,2071	2,2717



Moda (Phi) :	-4,52
Diam.medio Folk & Ward MZ (Phi) :	-1,658
Diam.mediano o dimens. media (Phi) :	-2,545

	(Phi)	(mm)
Classazione/Sorting Index (So) di Trask 1932 :		3,999
Deviazione interquartile (Krumbein) :		5,882
Dispers./Inclus.Graphic St. Deviation Folk&Ward 1957 :	2,436	
Asimm./Inclus.Graphic Skewness di Falk & Ward 1957 :	0,430	
Curtosi/Graphic Kurtosis di FolK & Ward 1957 :	0,718	

Ge, lì …….

Tecnico Operatore: ……..……..…….

Pagina 2: elaborazioni